

## 二、涌吐剂

瓜蒂散：（《伤寒论》）

[组成]：瓜蒂 3 克、赤小豆 3 克、香豉 20 克。

[用法]：前二味，各为末，再混和，每服 3 克，以香豉 20 克，用热汤 150 毫升，煮作稀粥，去滓，取汁合散，候温，顿服；可再作服；得吐乃止。

[作用]：催吐。

[用治]：误食毒物停留胃脘，见胸中痞硬，气上冲咽喉不得息者。

独圣散：（《儒门事亲》）

[组成]：瓜蒂。

[用法]：研为细末，每服 6 克，韭汁调服；得吐乃止。

[作用]：催吐。

[用治]：痰食停留胃脘、癫痫，见痰涎宿食，壅塞上脘，胸中痞硬，心中烦闷者。

三圣散：（《儒门事亲》）

[组成]：防风、瓜蒂各 6 克、藜芦 3 克。

[用法]：各为粗末，每服 15 克，以韭汁 3 茶盏，先用 2 盏煎三、五沸，去韭汁；次入 1 盏，煎至三沸；将前 2 盏，同一处熬二沸，去滓澄清，徐徐服之，不必尽剂，以吐为度。

[作用]：催吐，执惊厥。

[用治]：误食毒物停留胃脘、癫痫，见失音，闷乱，痰壅，牙关紧闭，脉滑实者。

救急稀涎散：（《圣济总录》）

[组成]：皂角刺 20 克、白矾 30 克。

[用法]：研极细为散，1 次服 2 克--3 克，温水调，灌下；得吐乃止。

[作用]：催吐，排痰。

[用治]：脑血管意外，见喉中痰声漉漉，气闭不通，心神瞽闷，或倒仆不省，或口眼歪斜，不能言语，但不遗尿，脉象滑实有力者。

稀涎千缙汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：半夏 25 克、皂角刺 4 克、甘草 3 克、白矾 6 克。

[用法]：为末，用生姜自然汁少许，温水 1 盏，调宋 3 克，灌服；得吐乃止。

[作用]：催吐，排痰。

[用治]：昏迷，见喉中声如牵锯，昏迷不省，脉滑实有力者。

景岳吐法、（《景岳全书》）

[组成]：莱菔子 50 克。

[用法]：捣碎，以温开水和搅，取淡汤徐徐饮之，用棉签扫咽喉引吐。

[作用]：催吐，提高胃幽门部环行肌的紧张性和降低胃底部纵行肌紧张性，抗葡消炎。

[用治]：痰食停留胃脘，见痰壅喉间，气逆喘急，口气酸臭者。

盐汤探吐方：（《备急千金要方》）

[组成]：饱和的生盐溶液 3 碗。

[用法]:热饮 1 碗，以棉签扫咽喉，刺门令吐宿食使尽，不吐更服，吐讫复饮，三吐乃住静止。

[作用]:催吐。

[用治]:宿食毒物停留胃中、暴饮暴食，见吐泻不得，心中烦满，口气酸臭者。