

三、泻下剂

（一）寒下方剂

大承气汤：（《伤寒论》）

[组成]：大黄 12 克、厚朴 20 克、枳实 15 克、芒硝 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进腹腔器官的血液循环，退热降体温。

[用治]：急性单纯性肠梗阻、急性胆囊炎、急性胰腺炎、粘连性肠梗阻、溃疡病合并急性穿孔而采用非手术治疗、蛔虫性肠梗阻、急性阑尾炎，见发热，不恶寒，反恶热，潮热谵语，胸胁脘腹满急胀痛，矢气频频，大便秘结，舌苔焦黄起刺，或焦黑燥裂，脉沉实者。

三一承气汤：（《黄帝素问宣明论方》）

[组成]：人黄 6 克、芒硝 6 克、厚朴 6 克、枳实 6 克、甘草 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进腹腔器官的血液循环，退热降体温。

[用治]：单纯性肠梗阻、死胎不下、急性阑尾炎，见大便秘结，腹满按之硬痛，小便赤涩，脉沉实者。

小承气汤：（《伤寒论》）

[组成]：大黄 12 克、厚朴 6 克、枳实 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进腹腔器官的血液循环，退热降体温。

[用治]：单纯性肠梗阻，见潮热谵语，便结不通，胸腹痞满，苔黄糙，脉滑数者。

陷胸承气汤：（《通俗伤寒论》）

[组成]：瓜蒌仁 15 克、枳实 10 克、大黄 10 克、半夏 10 克、黄连 5 克、风化硝 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进腹腔器官的血液循环，退热降体温。

[用治]：急性胃扩张、单纯性肠梗阻，见发热，胸膈痞满而痛，甚则神昏谵语，大便秘结，苔黄而腻，脉沉滑实者。

三化汤：（《素问病机气宜保命集》）

[组成]：厚朴 5 克、大黄 5 克、枳实 5 克、羌活 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进腹腔器官的血液循环。

[用治]：单纯性肠梗阻，见恶风寒，发热，头痛，大便秘结，腹痛痞满，小便短少，苔黄，脉滑实音。。

紫草承气汤：（《证治准绳》）

[组成]：厚朴 10 克、大黄 15 克、枳实 5 克、紫草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，得利，减半剂量。

[作用]：通便，抑制细菌、病毒，改善血循环，解毒。

[用治]：水痘、带状疱疹、疔疮、肠梗阻，见代谢障碍轻度中毒，或痘疮将透，腹胀满，烦躁口渴，甚则谵语，大便秘结，苔黄腻，脉数有力替。

犀连承气汤：（《通俗伤寒论》）

[组成]：犀角 3 克、黄连 5 克、枳实 10 克、生地黄 30 克、大黄 10 克、金汁 10 毫升。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：通便，降体温，解毒。

[用治]：肠梗阻，见代谢障碍轻度中毒，神昏谵语，甚则神昏不语，大便秘结，苔黄糙，或焦黑，脉沉滑者。

调胃承气汤：（《伤寒论》）

[组成]：大黄 12 克、甘草 6 克、芒硝 10 克（融化）。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进腹腔器官的血液循环，降体温。

[用治]：单纯性肠梗阻、粘连性肠梗阻、急性胰腺炎、急性胆囊炎等，见发热，口渴，心烦，大便秘结，腹痛拒按，苔黄而干，脉滑数者。

芒硝散：（《太平圣惠方》）

[组成]：芒硝 10 克大黄、黄芩、栀子、甘草各 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，抑菌。

[用治]：软组织化脓性感染、单纯性肠梗阻，见背部生痈，大便不通，心神烦躁，脘腹满闷者。

牛黄通腑汤：（《医学启源》）

[组成]：大黄、甘草各 15 克、芒硝 5 克、牛黄 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，促进代谢废物的排除，解毒。

[用治]：脑血管意外，见便秘，腹中痛而可扪及粪块，神昏，痰鸣，苔黄腻，脉沉滑者。

当归承气汤：（《素问病机气宜保命集》）

[组成]：当归 12 克、大黄 12 克、甘草 6 克、芒硝 10 克、生姜 15 克、大枣 10 枚
[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，改善胃肠血循环。

[用治]：便秘、痔疮便秘，见发热谵语，大便秘结，脉细数者。

厚朴大黄汤：（《金匱要略》）

[组成]：厚朴 20 克、大黄 15 克、枳实 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，改善胃肠血循环，排痰。

[用治]：急性胃扩张、单纯性肠梗阻，见胸腹胀满，呼吸不利，大便秘结，咳嗽，心下时痛，苔厚腻而黄，脉滑实者。

厚朴三物汤：（《金匱要略》）

[组成]：厚朴 20 克、大黄 12 克、枳实 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，改善胃肠血循环，排痰。

[用治]：急性胃扩张、急性胃炎，见脘腹胀满而痛，大便秘结，苔腻而黄，脉沉实者。

大陷胸丸、（《伤寒论》）

[组成]：人黄 10 克、葶苈子 10 克、芒硝 10 克、杏仁 10 克、甘遂 4 克。

[用法]：捣、筛前两药，将杏仁、芒硝合研如脂，和散作小丸；另用甘遂末 1 克，白蜜 2 匙--3 匙，水 2 碗，煮取 1 碗，乘温送服上丸 10 克，1 日服药 2 次，以便行为度。

[作用]通便，抑杀细菌，消炎。

[用治]：急慢性胰腺炎、急慢性胆囊炎，见颈项强直，胸脘痞满，或短气汗出，大便秘结，脉沉实者。

大陷胸汤：（《伤寒论》）

[组成]：大黄 15 克、芒硝 15 克、甘遂 2 克。

[用法]：水煎 2 次，作 2 次送服甘遂末，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，抑菌消炎。

[用治]：急性胃扩张、急性胰腺炎并发麻痹性肠梗阻，见发热，大便秘结，日晡小有潮热，从心下至少腹硬满而痛不可近，舌燥而渴，脉沉紧者。

大黄牡丹汤：（《金匱要略》）

[组成]：大黄 10 克、牡丹皮 5 克、桃仁 12 克、冬瓜仁 20 克、芒硝 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：通便，改善腹腔血循环，抗菌消炎。

[用治]：急性阑尾炎、膀胱直肠窝脓肿、子宫直肠窝脓肿、痛经、闭经，见少腹肿痞按之痛如淋，小便自调，发热恶寒，白汗出，苔黄腻，脉滑数者。

大黄汤：（《证治准绳》）

[组成]：大黄 5 克、牡丹皮 5 克、硝石 5 克、白芥子 5 克、桃仁 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：通便，改善腹腔血液循环，抗菌消炎。

[用治]：急性阑尾炎、膀胱直肠窝脓肿、子宫直肠窝脓肿，见少腹肿痞、坚硬、热感、按痛，肤色或赤或白，有汗，脉数者。

大黄甘草汤：（《金匱要略》）

[组成]：大黄 12 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：增强胃肠蠕动，健胃，抗菌消炎。

[用治]：急性胃炎，见食已即吐，吐势急迫，吐物酸馊，大便干硬，苔黄，脉滑实者。

枳实导滞丸、（《内外伤辨惑论》）

[组成]：人黄 30 克、枳实 15 克、黄芩 10 克、黄连 10 克、神曲 15 克、白术 10 克、茯苓 10 克、泽泻 6 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次，温水送下；或以上药各 1/3 量，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌消炎，调整胃肠功能。

[用治]：急性胃肠炎、细菌性痢疾，见胸脘痞闷，下痢后重，或泄泻腹痛，或人便秘结，小便黄赤，舌红，苔黄腻，脉沉实者。

黄龙汤：（《伤寒六书》）

[组成]：大黄 9 克、芒硝 12 克、枳实 6 克、厚朴 3 克、甘草 3 克、人参 6 克、当归 9 克、生姜 9 克、大枣 2 枚桔梗 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，抑菌消炎，解毒，增强免疫力。

[用治]：老年性肠梗阻、肠麻痹、粘连性肠梗阻等，见中毒症状，下利清水，腹满硬痛拒按，谵语，口舌干燥，身热，神疲少气，便秘，甚则循衣摸床，撮窄理线，神昏肢厥，舌苔焦黄或焦黑，脉沉细数者。

新加黄龙汤：（《温病条辨》）

[组成]：生地黄 15 克、甘草 6 克、人参 5 克、生大黄 9 克、芒硝 3 克、玄参 15 克、麦冬 15 克、当归 5 克、海参 10 克、姜汁 10 毫升

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，抑菌消炎，解毒，改善水液代谢，增强免疫力。

[用治]：老年性肠梗阻、肠麻痹、粘连性肠梗阻等，见中毒症状，大便秘结，腹中胀满而硬痛，神疲少气，口干咽燥，唇裂舌焦，苔黄干或焦黑，脉沉弱或沉涩者。

大五柔丸、（《备急千金要方》）

[组成]：大黄、白芍、枳实、肉苁蓉各 60 克、桃仁 100 克杏仁 50 克葶苈子、黄芩、牛膝、甘草各 60 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次，温酒下。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进胃肠血循环。

[用治]：习惯性便秘、老年性便秘、痔疮，见大便干硬难行，短气，腰痛，脉涩者。

增液承气汤：（《温病条辨》）

[组成]：玄参 30 克、麦冬 24 克、生地黄 24 克、大黄 9 克、芒硝 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，调整水液代谢 c[用治]：便秘、痔疮、糖尿病，见身热，口渴，大便秘结，口燥咽干，舌红干，苔黄燥，脉细数者。

承气养营汤：（《瘟疫论》）

[组成]：知母 10 克、当归 5 克、白芍 10 克、牛地黄 10 克、大黄 10 克、枳实 5 克、厚朴 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：通便，调整水液代谢。

[用治]：肠梗阻、老年性便秘、痔疮、粘连性肠梗阻，见身热不解，腹硬满痛，咽干渴饮，唇燥口裂，大便不通，舌质红，苔黄，脉数者。

玉烛散：（《儒门事亲》）

[组成]：当归、川芎、熟地黄、白芍、大黄、芒硝甘草各 3 克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：改善腹腔血液循环，增烈腹腔器官的活动。

[用治]：月经过期、闭经、便秘，见大便秘结，或经候不通，腹胀作痛，脉细者。

复方大承气汤：（《中西医结合治疗急腹症》）

[组成]：大黄15克、芒硝9克、厚朴、莱菔子各30克、枳壳、桃仁各9克、赤芍15克。

[用法]：水煎2次，作2次服，1日服2剂，以便行为度；可用胃管注入；经2小时—3小时后，可另用本方煎汤灌肠。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进胃肠血循环。

[用治]：单纯性肠梗阻、粘连性肠梗阻，见大便秘结，脘腹胀痛，呕吐不能食，舌苔黄腻，脉沉实者。

阑尾清化汤：（《中西医结合治疗急腹症》）

[组成]：大黄15克、牡丹皮15克、桃仁15克、赤芍12克、金银花30克、蒲公英30克、川楝子9克、甘草9克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抑菌，消炎，通便，促进胃肠血循环。

[用治]：急性阑尾炎，见蕴热期，发热，午后热甚，口干渴，便秘，右少腹拘急疼痛，尿黄，舌红，苔黄腻，脉滑数者。

阑尾清解汤：（《中西医结合治疗急腹症》）

[组成]：大黄24克、牡丹皮15克、冬瓜仁30克、金银花60克、蒲公英30克、川楝子9克、木香9克、甘草9克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，通便，促进胃肠血循环。

[用治]：急性阑尾炎，见热毒期，发热恶寒，口干渴，面红耳赤，唇干舌燥，呕恶不食，腹胀痛拒按，便秘，尿黄，舌质红绛，苔黄腻或黄糙，脉滑数者。

阑尾化瘀汤：（《中西医结合治疗急腹症》）

[组成]：犬黄 9 克、牡丹皮 9 克、桃仁 9 克、金银花 15 克、J|1 楝子 15 克、延胡索 9 克、木香 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，通便，促进胃肠血循环。

[用治]：急性阑尾炎，见瘀滞期，发热不高，右少腹痞结疼痛，暖气纳减，恶心反胃，大便秘结，尿黄，苔白腻，脉弦紧者。

泻下通瘀合剂：（《江苏中医杂志》）

[组成]：大黄 15 克、芒硝 20 克、桃仁 15 克、枳实 12 克、生地黄 20 克、麦冬 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂 n[作用 1、通便，调整水液代谢。

[用治]：流行性出血热，见少尿期，壮热不退，头痛，眼眶痛，眼结膜充血，腰痛，神疲，面红，水肿，咽部充血，尿少，舌质红或绛，脉细数者。

升清通结汤：（《四川中医》）

[组成]：大黄 10 克、芒硝 1. 克、升麻 9 克、枳实 6 兜、厚朴 10 克。

[用法]、水煎2次作2次服，1日服2剂，以便行为度；上药为6岁小儿用量；如年龄大者可酌加用量；如年龄小者可酌减用量。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进胃肠血循环，中和代谢障碍所产生的毒素。

[用治]：小儿肠梗阻，见便闭腹痛，腹胀，呕吐，急性病容，呻吟不止，腹部有压痛，有肠型，肠鸣音亢进，舌质红，苔黄燥，脉弦数者。

甘遂杏仁通结汤：（《浙江中医杂志》）

[组成]、甘遂1克、大黄12克、枳壳10克、杏仁12克、厚朴12克、当归12克、莱菔子15克、槟榔15克。

[用法]：水煎送服甘遂末，1日服2剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进胃肠血循环。

[用治]：肠梗阻、粘连性肠梗阻、痔疮，见便闭，腹痛，腹胀，见肠形或肠蠕动波，有压痛或有轻度的肌紧张及反跳痛，呕吐，尿少而黄，舌质红，苔黄燥，脉弦滑数者。

通阻汤：（《四川中医》）

[组成]：大黄15克、厚朴10克、枳实15克、番泻叶10克、莱菔子30克、元明粉10克、红花6克。

[用法]、水煎2次作2次服，1日服2剂，以便行为度。

[作用]：通便，增强胃肠蠕动，促进胃肠血循环。

[用治]：急性肠梗阻、粘连性肠梗阻，见腹胀，腹痛，痛而拒按，无大便，无矢气，呕吐频繁，见肠形，舌质红，苔黄，脉弦滑数者。

术后方：（《上海中医药杂志》）

[组成]、大黄 9 克、枳壳 9 克、延胡索 15 克、甘草 5 克。

[用法]、水煎成 100 毫升，术后 6 小时开始服用，每次 20 毫升，2 小时 1 次；连服 2 剂，一般均能排气；若 48 小时尚未排气，可再服 2 剂。

[作用]：增强胃肠蠕动，改善手术切口血循环，止痛。

[用治]：妇科病手术后见肠胀气者。

清胆涤导汤：（《辽宁中医杂志》）

[组成]：大黄 31 克、蜂螂虫 1 对、郁金 10 克、木香 15 克、槟榔 15 克、枳实 15 克、白芍 15 克、甘草 15 克。

[用法]：蜂螂虫研粉，分 2 次冲服；水煎 2 次作 2 次服，1 日服 4 剂。

[作用]：增强胆管和胃肠的蠕动，消炎，止痛。

[用治]：胆管死蛔病、急性胆囊炎，见胁痛，右上腹阵发性剧痛转为隐痛，巩膜黄染，墨菲氏征阳性，厌食呕吐，口苦口干，尿黄，便秘，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数者。

（二）温下下方剂

大黄附子汤：（《金匮要略》）

[组成]：大黄 9 克、附子 10 克、细辛 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：增强心力，促进血循环，通便。

[用治]：粘连性肠梗阻、急性单纯性肠梗阻，见胁下偏痛，腹痛喜温热，便秘，苔白，脉紧者。

三物备急丸：（《金匱要略》）

[组成]：大黄、巴豆、干姜各 10 克。

[用法]：将大黄、干姜为末，研巴豆，合用为散或蜜制小丸，1 次服 0.5 克，1 日服 2 次，相隔 4 小时；以便行痛止为度。

[作用]：通便，止痛。

[用治]：急性单纯性肠梗阻、胆绞痛、急性胰腺炎，见心腹胀痛，痛如锥刺，气急，口噤，甚至暴厥，不省人事，大便秘结，肢冷，脉伏者。

三物白散：（《伤寒论》）

[组成]：巴豆 5 克、桔梗 15 克、浙贝母 15 克。

[用法]：为散，1 次服 1 克，1 日服 2 次，相隔 4 小时。

[作用]：通便，排痰，加强胸膜炎症的修复，加强对胸腔积液的重吸收。

[用治]：支气管炎、渗出性胸膜炎、肺脓疡，见胸脘痞闷，按之则痛，或心下硬满而痛，或喘咳气逆，或大便不通，或肺痈咽干不渴、时出浊唾腥臭、久久吐脓不止，脉滑者。

温脾汤：（《备急千金要方》）

[组成]：大黄 12 克、附子 10 克、人参、干姜、甘草各 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：通便，强心，促进血液循环。

[用治]：蛔虫性腹痛、消化不良、肝硬化腹水、肠梗阻，见大便秘结，腹痛而冷，手足小温，或久痢赤白，面无华色，口不渴，舌质淡，苔白，脉沉弦者。

（三）润下方剂

麻子仁丸：（《伤寒论》）

[组成]：麻仁 100 克、白芍 25 克、枳实 25 克、大黄 50 克、厚朴 30 克、杏仁 50 克。

[用法]：蜜制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或以上药各 1/5 量，水煎 2 次作 2 次服，1 口服 2 剂，以便行为度。

[作用]：润肠通便，增强肠的蠕动。

[用治]：肛门疾患术后、老年性便秘、习惯性便秘，见大便于硬难排出，或三、五日一行，或五、七日一行，小便频数，苔薄腻，脉沉涩或细者。

润肠丸、（《兰室秘藏》）

[组成]：桃仁、麻仁各 30 克、当归梢、大黄、羌活各 3 克。

[用法]：除桃仁、麻仁另研如泥外，捣为极细末，蜜制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次，开水或米饮送服；或以上药各 1/7 量，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：润肠通便，增强肠的蠕动。

[用治]：肛门疾患术后、习惯性便秘、老年性便秘，见大便秘涩，或干燥闭塞不通，不思饮食者。

三仁承气汤：（《通俗伤寒论》）

[组成]：火麻仁 9 克、松子仁 9 克、枳实 5 克、大腹皮 6 克、杏仁 9 克、大黄 3 克、木香 2 克、猪胰 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：润肠通便，增强肠蠕动 c[用治]、老年性便秘、习惯性便秘、热病后大便秘结，见大便干硬，小便频数者。

五仁丸、（《世医得效方》）

[组成]：桃仁、杏仁各 30 克、柏子仁 15 克、松子仁 4 克郁李仁 3 克、陈皮 120 克。

[用法]：将五仁另研为膏，入陈皮末研匀，蜜制小丸，1 次服 15 克，1 日服 3 次，米饮送下；或以上药各 1 / 3 量，陈皮用 10 克，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：促进胃肠平滑肌的蠕动，润肠通便。

[用治]：习惯性便秘、热病后便秘，见大便干结，或三、五日一行，或五、七日一行，余无所苦者。

益血润肠丸、（《类证活人书》）

[组成]：熟地黄 30 克、杏仁、火麻仁各 15 克、枳壳、橘红各 10 克、阿胶、肉苁蓉各 8 克、苏子、荆芥各 5 克、当归 15 克。

[用法]：前三味杵为膏，后七味为细末，蜜制小丸，1 次服 15 克，1 日服 3 次，白汤送下；或以上药各半量，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：润肠通便，调整体液代谢。

[用治]：老年性便秘、习惯性便秘，见人便干硬难行，形体瘦弱者。

济川煎：（《景岳全书》）

[组成]：当归 12 克、牛膝 6 克、肉苁蓉 8 克、泽泻 5 克、升麻 3 克、枳壳 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：润肠通便，改善肠的血液循环，调整体液代谢。

[用治]：老年性便秘、习惯性便秘，见大便秘结，腰膝酸冷，小便频作，脉沉弱者。

苁蓉润肠丸：（《金匱翼》）

[组成]：肉苁蓉 60 克、沉香 60 克、麻仁 100 克。

[用法]：为末，用麻仁汁打糊为小丸。1 次服 10 克，I F1 服 3 次；或以上药各 1/10 量（沉香：喝服），水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：增强胃肠的蠕动，润肠通便。

[用治]：老年性便秘、习惯性便秘，见大便干硬，行便无力，或气逆喘促者。

当归郁李仁汤：（《兰室秘藏》）

[组成]：郁李仁、皂角仁各 6 克、枳实 4 克、秦艽麻仁、当归、生地黄、苍术各 3 克、大黄、泽泻各 2 克。

[用法]：皂角仁为末，余药水煎取汁，分 2 次，送皂角仁末，饭前服。1 日服 1 剂 D[作用]：润肠通便，改善肠道血循环。

[用治]：脱肛、痔漏，见大便硬，肛脱作痛而出血者。

当归润燥汤：（《兰室秘藏》）

[组成]：当归、麻仁、知母、黄柏、石膏：桃仁、防风、荆芥穗各 5 克、生甘草、甘草各 5 克、熟地黄 10 克、柴胡 5 克、细辛 1 克、升麻 5 克、红花 5 克、杏仁 5 克、川椒 0.1 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：润肠通便，改善肠道血循环。

[用治]：老年性便秘、习惯性便秘，见大便干硬，舌燥口干，兼喜温饮者。

通幽汤：（《兰室秘藏》）

[组成]：甘草、红花各 2 克、生地黄、熟地黄各 10 克、升麻、桃仁、当归各 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：润肠通便，改善胃肠血循环。

[用治]：幽门梗阻、习惯性便秘，见大便难、甚或便秘，或腹痛，噎气，咽干口渴，脉细涩者。

二仁丸、（《普济方》）

[组成]：杏仁、麻仁、枳壳、诃子肉各 10 克。

[用法]：为末，制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次。

[作用]：调节胃肠平滑肌的蠕动，润肠通便。

[用治]：老年性便秘，见大便干硬难行，脉细弱者。

威灵仙丸：（《世医得效方》）

[组成]：黄芪 60 克、枳实 45 克、威灵仙 45 克。

[用法]：为末，蜜制小丸，1 次服 20 克，1 日服 3 次，姜汤送下：或以上药各 1/量，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：润肠通便，增强胃肠的蠕动。

[用治]：老年性便秘，见老年气衰，津液枯燥，大便秘结，脉细弱者。

五仁润肠丸：（《全国中药成药处方集》）

[组成]：生地黄 120 克、桃仁、火麻仁各 30 克、郁李仁 90 克、柏子仁 50 克、肉苁蓉 30 克、陈皮 120 克、大黄、当归各 30 克、松子仁 90 克。

[用法]：共研细粉，炼蜜为丸，1 次服 9 克，1 口服 3 次，开水送下。

[作用]：润肠通便，改善胃肠血循环 n[用治]：习惯性便秘、老年性便秘，见便秘，腹胀，食少，消化不良者。

润下降逆汤：（《中医杂志》）

[组成]：桃仁 45 克、杏仁 30 克、柏子仁 45 克、郁李仁 1. 克、松子仁 30 克、当归 30 克、火麻仁 60 克、旋覆花 15 克、代赭石 30 克、党参 15 克、半夏 15 克、生姜 10 克、大枣 5 枚、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]：润肠通便，增强胃肠的蠕动。

[用治]：幽门梗阻、老年性便秘、习惯性便秘，见胃脘胀痛，食后腹胀，暖气，消瘦，神疲，大便干燥，状如羊屎，尿少，色如浓茶，舌质红，苔黄燥，脉细数者。

（四）逐水方剂

十枣汤：（《伤寒论》）

[组成]：芫花、甘遂、大戟各 10 克。

[用法]：为细末，清晨空腹取 1.5 克，以大枣 10 枚煎汤待温送下，得快利止后服，而以粥调养，如利而病不除，可再服。不可久服。

[作用]：泻水，增强对胸膜炎症的修复、对渗出液的重吸收。

[用治]：渗出性胸膜炎（胸腔积液）、肝硬化合并腹水，见咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，或胸背掣痛不得息，苔滑，脉沉弦者。

小消化水丸：（《外台秘要》）

[组成]：大黄、甘遂、葶苈子、芫花各 30 克、巴豆 5 克。

[用法]：研末，炼蜜为小丸，1 次服 3 克，1 日服 2 次，开水送下，24 小时内不超过 2 次；肿消大半则停药。

[作用]：促进胃肠蠕动，增强利尿，增强对腹水的重新吸收。

[用治]：肝硬化腹水，见通身微肿，腹大，食饮不消，一二便不利，脉实者。

芫花丸：（《太平圣惠方》）

[组成]：芫花、大戟、甘遂、大黄各 30 克、青皮 45 克。

[用法]：为细末，制为小丸，每次服 5 克，食前以酒送下，1 日 2 次。

[作用]：泻水利尿、促进腹腔血循环。

[用治]：肝硬化腹水，见四肢浮肿，心腹气滞，脘腹胀满，不思饮食，脉实者。

小胃丹：（《丹溪心法》）

[组成]：芫花、甘遂、大戟各 15 克、黄柏 9 克。

[用法]：为末，粥丸麻子大，1 次服 3 克，1 日服 2 次，临卧津液吞下，或白汤一口送下：不可久服。

[作用]：泻水利尿，增强对渗出液的重吸收，消炎。

[用治]：肝硬化腹水、渗出性胸膜炎，见浮肿，大便不通，干呕短气，或咳唾胸胁疼痛，苔黄腻，脉实者。

控涎丹：（《三因方》）

[组成]：甘遂、大戟、白芥子各 10 克。

[用法]：各药为细末，制成小丸，1 次服 2 克，1 日服 2 次，食后临卧温开水送服；不宜久服 c[作用]：增强对病理渗出液的重吸收，调整水液代谢。

[用治]：渗出性胸膜炎，见胸背腰隐痛、筋骨牵引痛，或手足麻痹或头痛不可忍，或皮肤麻痹，神志昏睡，痰唾稠粘。

舟车丸、（《景岳全书》）

[组成]：黑丑 120 克、甘遂、芫花、大戟各 30 克、大黄 60 克、青皮、陈皮、木香槟榔各 15 克、轻粉 3 克。

[用法]：共为末，水糊制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次，空心温下；不可久服。

[作用]：通便，泻水，利尿，改善腹腔血循环。

[用治]：肝硬化腹水，见腹大胀满坚硬，气粗，口渴，小便不利，大便秘结，苔腻，脉沉数有力者。

三花神桔丸、（《黄帝素问宣明论方》）

[组成]：甘遂、大戟、芫花各 15 克、牵牛子 60 克。

大黄 30 克、轻粉 3 克。

[用法]：为末，制为小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次，温水下；不可久服。

[作用]：泻水利尿，调整水液代谢，通便。

[用治]：肝硬化腹水，见喘咳，中满腹胀，黄瘦困倦，肢体麻痹，走注疼痛，二便不利，头目眩晕，脉实者。

大戟散：（《太平圣惠方》）

[组成]：大戟、甘遂、千金子、牵牛子、葶苈子各 15 克。

[用法]：研细共为散，1 次服 2 克，1 日服 2 次，灯心草汤调下；不可久服 c[作用]：泻水，利尿，通便。

[用治]：肝硬化腹水，见心腹膨胀，喘息，大便干结，小便少，脉实者。

疏凿饮子：（《济生方》）

[组成]：羌活、槟榔、大腹皮、茯苓皮、椒目、木通、泽泻、商陆、赤小豆各 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，iR 服 2 剂。

[作用]：泻水通便，利尿，调整水液代谢。

[用治]、肾性水肿，见遍身浮肿，喘息，口渴，小便不利，大便秘结，脉滑者。

己椒苈黄丸、（《金匱要略》）

[组成]：防己、椒目、葶苈子、大黄各 30 克。

[用法]：为末，蜜制小丸，1 次服 6 克，1 日服 3 次，饭前米汤下；或以上药各 1/5 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：利尿，通便，改善腹腔血循环。

[用治]：肝硬化腹水，见腹满，或下肢微肿，二便不利，口舌干燥，脉沉弦者。

浚川丸、（《证治准绳》）

[组成]、大戟、芫花、沉香、檀香、南木香、槟榔莪术、大腹皮、桑白皮各 15 克、牵牛子 30 克、巴豆 15 克。

[用法]、研细末，制成小丸，1 次服 3 克，1 日服 2 次，浓煎葱汤候温空心送下；不可久服。

[作用]、泻水通便，促进腹腔器官的活动。

[用治]、肝硬化腹水，见遍身浮肿，气促食减，一二便不利，苔腻，脉沉实有力者。

海金沙散：（《医学发明》）

[组成]：海金沙、甘遂各 15 克、牵牛子 45 克。

[用法]：为细末或作小丸，1 次服 3 克，1 日服 2 次；不可久服。

[作用]：利尿，通便。

[用治]：肝硬化腹水，见全身性浮肿，喘不得卧，二便不利，苔腻，脉沉实者。